



**Dužina vegetacije - vrlo rani**

### **Biljka**


- Srednje visoka
- Bujan porast
- Prilično dobro pokriva tlo
- Cvjeta slabo
- Bijeli cvijet

### **Gomolj - oblik**

- ovalan
- vrlo plitka okca
- krupan

### **Gomolj - boja**

- pokožica - žuta
- meso - svjetložuta



### **Urod**

- vrlo visok

### **Kvaliteta**

- uglavnom se ne raskuhava
- kuhanjem ne mijenja boju
- osrednji sadržaj suhe tvari

### **Otpornost**


- Fitoftora - malo osjetljiv
- Trulež gomolja - malo osjetljiv
- Virus A - vrlo malo osjetljiv
- Virus Yn - vrlo malo osjetljiv
- Virus X - umjereno osjetljiv
- Kovrčavost lista - malo osjetljiv

### **Nematode** - otporan A (Ro1)

- Rak krumpira - otporan
  - Krastavost - malo osjetljiv
  - Suša - malo osjetljiv
-



- **Dužina vegetacije** - vrlo rani
- **Biljka**
  - niska
  - početni porast spor
  - dobro pokriva tlo
  - cvate osrednje
  - cvjet je crvenoljubicast
- **Gomolj** - oblik
  - okruglo ovalan
  - okca plitka
  - vrlo krupan
- **Gomolj** - boja
  - kožica - bijelo-žuta
  - meso - svjetložuta



## Urod

- vrlo visok
- Kvaliteta
- ne raskuhava se
- kuhanjem ne mijenja boju
- sadržaj suhe tvari nizak

## Otpornost

- Fitoftora - umjereno osjetljiv
- Trulež gomolja - malo osjetljiv
- Virus A - vrlo malo osjetljiv
- Virus Yn - malo osjetljiv
- Virus X - vrlo malo osjetljiv
- Blattroll - vrlo malo osjetljiv

**Nematode** - otporan A (Ro1)

Rak - otporan

Krastavost - umjereno osjetljiv

Suša - vrlo malo osjetljiv



# VELOX



## BILJKA

Dužina vegetacije	Vrlo rana sorta
Tip rasta	Međutip
Habitus	Upravran
Boja cvijeta	Svjetlo crveno/ružičast
Rani porast	Brz
Broj gomolja u busu	Srednji
Mirovanje gomolja	Srednje

## OSOBINE GOMOLJA

Oblik gomolja	Izduženo ovalan
Boja mesa	Svjetlo žuta
Dubina okaca	Plitka
Boja pokožice	Žuta
Konzistencija pokožice	Mrežasta



## UROD I KVALITETA

Namjena i korištenje	Krumpir za jelo, za pakiranje i pommes frites
Urod	Srednji - visok
Udio krupnih gomolja	Visok
Udio sitnih gomolja	Vrlo nizak - nizak
Tip kuhanja	Ne raskuhava se
Promjena boje kuhanjem	Slaba
Promjena boje sirov. Pirea	Neznatna
Sadržaj škroba	Nizak - srednji 12 - 14 %

## OTPORNOST NA BOLESTI

Rak krumpira	Patotip 1
Nematode	Ro1,4
Fitoftora	Srednja
Trulež gomolja	Niska do srednja
Krastavost gomolja	Visoka
Rhizoctonia	Visoka
Crna noga	Visoka
Željezna mrljavost	Srednja do visoka
Oštećenje gomolja	Srednja
Crna mrljavost	Visoka
Y - virus	Srednja
Virus kovrčav. lista	Visoka - vrlo viso



# AROSA



## BILJKA

Dužina vegetacije	Vrlo rani
Tip rasta	Međutip
Habitus	Usporavan-polu uspr.
Boja cvijeta	Crvenoljubičasta
Rani porast	Brz
Broj gomolja u busu	Srednji
Mirovanje gomolja	Srednje

## OSOBINE GOMOLJA

Oblik gomolja	Ovalan
Boja mesa	Žuta
Dubina okaca	Plitka - srednja
Boja pokožice	Crvena
Konzistencija pokožice	Glat



## UROD I KVALITETA

Namjena i korištenje	Za jelo, za pomfrit
Urod	Srednji - visok
Udio krupnih gomolja	Srednji - visok
Udio sitnih gomolja	Nizak
Tip kuhanja	Pretežno čvrst
Promjena boje kuhanjem	Slaba
Promjena boje sirov. Pirea	Slaba-srednja
Sadržaj škroba	Srednji-visok (15-17%)

## OTPORNOST NA BOLESTI

Rak krumpira	Patotip 1
Nematode	Ro1,4
Fitoftora	Srednja
Trulež gomolja	Visoka
Krastavost gomolja	Visoka
Rhizoctonia	Visoka
Crna noga	Visoka
Željezna mrljavost	Visoka
Oštećenje gomolja	Visoka
Crna mrljavost	Visoka
Virus kovrčav. lista	Srednja-visoka



# DEN HARTIGH

## MINERVA

### OPIS SORTE

Grupa zrenja	rani
Cima	srednje visoka, prilično bujan rast, dobro pokriva tlo, cvjeta osrednje, cvijet je bijel
Gomolj oblik	ovalan, okca plitka, krupan
Boja pokožice	žuta
Boja mesa	žuta
Prinos	vrlo visok
Kvaliteta	prilično brašnjav, kuhanjem ne mijenja boju, sadržaj suhe tvari visok, vrlo je pogodan za proizvodnju Pommfrita
Fitoftora	malo je osjetljiv
Trulež gomolja	malo je osjetljiv
Virus A	vrlo malo osjetljiv
Yn	malo osjetljiv
X	vrlo malo osjetljiv
kovrčavost list	malo osjetljiv
Nematode	otporan
Rak krumpira	otporan
Krastavost	umjereno osjetljiv
Osjetljivost na sušu	umjereno osjetljiv



### PREPORUKA ZA UZGOJ

Tlo	najviše mu odgovara lagano ilovasto tlo
Gnojidba N	uobičajena količina
Gnojidba P	uobičajena količina
Gnojidba K	uobičajena količina
Korovi	osjetljiv je na SENCOR. Max.primijeniti 250 gr. po 1 ha
Zaustavljanje klijanja	Ne preporuča se tretirati sredstvima protiv klijanja u skladištu
Skladištenje	vrlo dobro se čuva na duže vrijeme